QCDの有限温度相転移 複合ヒッグス模型 電弱相転移

江尻信司(新潟大学)

共同研究者: 山田憲和(KEK)

End Point of a First-Order Phase Transition in Many-Flavor
Lattice QCD at Finite Temperature and Density
Physical Review Letters 110, 172001 (2013)
[arXiv:1212.5899]

北陸信越地区素粒子論グループ研究会
立山青少年自然の家、2013/5/25

QCD相転移のクォーク質量依存性

- クォーク質量をパラメーターと思うと面白い相構造を持っている。
- 物理的な質量での相転移を調べるためにも、クォーク質量依存性は考慮すべき。
- 定量的に相境界を計算することが必要。
- 有限密度で物理的な質量点が臨界面を横切るところが、クロスオーバーが一次相転移に変わる臨界点

ポリヤコフープの相転移温度での分布関数

1次相転移かどうか？ (WHOT-QCD, 10-13)

$\kappa=0$: $Z(3)$ 対称な分布

Ω : Polyakov loop
(閉じ込めのオーダーパラメータ)

相転移点での $|\Omega|$ の有効ポテンシャル
 $V_{\text{eff}}(|\Omega|) = -\ln[W(|\Omega|)]$

κ 小: 2相共存
(1次相転移)

臨界点付近:
山が1つになる

Critical point: $\kappa^4 \approx 2.0 \times 10^{-5}$

$\kappa \sim 1/(\text{クォーク質量})$

クォークが重い領域での (2+1)フレーバーQCDの臨界面

- 臨界面: フレーバー数が多いほど小さい。

有限密度での臨界面

$\kappa \sim 1/(\text{クォーク質量})$

「ヒッグス粒子は複合体」？

朝日新聞 2013年4月18日

- **テクニカラー模型**
  - QCDのカイラル対称性の破れのように、テクニフェルミオンが結合してヒッグス粒子を作る
- **ウォーキング・テクニカラー**
  - エネルギースケールが変わると、結合定数が非常にゆっくり変わる（変わらない場合を conformal という）
- **フレーバー数が多いQCDと似た模型で実現の可能性**
  - 格子QCDの数値シミュレーションで、検証可能

T. Appelquist, 2012年9月フィレンツェのGGIでの講義

多フレーバー・テクニカラーモデルと電弱相転移

(Kikukawa, Kohda and Yasuda, Phys.Rev.D77, 015014(2008))

- 多フレーバーQCDによるテクニカラーモデルの構築
- QCDのカイラル対称性の破れ
  - 有限温度電弱相転移
- 南部・ゴールドストーン(NG)・ボゾン
  - ゲージボゾンに吸われる3つ必要。
  - 他のNGボゾンは観測されていない。(質量の下限がある。)
  - 2つのテクニ・フェルミオンは質量0、他のフェルミオンは重い。
- 電弱バリオジェネシス
  - 強い1次相転移が必要。(標準モデルでは1次相転移にならない。)
  - 2+1-フレーバーQCDの類推:フェルミオンが重くなると1次相転移でなくなる。(質量の上限がある。)
- 多フレーバーQCDで1次相転移の終点を求めることが重要。
  - 2012年6月の Lattice2012 で、KEKの山田さんに一緒に研究しないか誘われる。

2+N_f-フレーバーQCDの相転移の次数

3重臨界点 m_E : $m_{ud}^c \sim (m_E - m_s)^{5/2}$
 $m_{ud}^c \sim \mu^5$

- すべてのクォークが十分軽い: 1次相転移
- 2つのクォークが質量0で、もう1つが重い: 2次相転移(?)
- 臨界線が N_f を大きくすると、質量が重い方に行く?
- 有限密度でどうか?

プラケットの確率分布関数(ヒストグラム)

一次相転移: 位相共存状態

$$W(P, \beta, m, \mu) \equiv \int DU \delta(\hat{P} - P) \prod_{f=1}^{N_f} \det M(m_f, \mu_f) e^{6N_{\text{site}} \beta \hat{P}} \quad (\beta = 6/g^2)$$

plaquette P (1x1 Wilson loop for the standard action)

$$R(P, \beta, \beta_0 m, m_0, \mu) \equiv W(P, \beta, m, \mu) / W(P, \beta_0, m_0, 0) \quad (\text{Reweight factor})$$

$$R(P) = \frac{\left\langle \delta(\hat{P} - P) e^{6N_{\text{site}}(\beta - \beta_0)\hat{P}} \prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)} \right\rangle_{(\beta_0, \mu=0)}}{\left\langle \delta(\hat{P} - P) \right\rangle_{(\beta_0, \mu=0)}} \equiv \left\langle e^{6N_{\text{site}}(\beta - \beta_0)\hat{P}} \prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)} \right\rangle_{P:\text{fixed}}$$

有効ポテンシャル:

$$V_{\text{eff}}(P, \beta, m, \mu) = -\ln[W(P, \beta, m, \mu)] = V_{\text{eff}}(P, \beta_0, m_0, 0) - \ln R(P, \beta, \beta_0 m, m_0, \mu)$$

$$\ln R(P) = \underline{6N_{\text{site}}(\beta - \beta_0)P} + \ln \left\langle \underline{\prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)}} \right\rangle_{P:\text{fixed}}$$

一次相転移点: 二相共存状態

プラケットの確率分布関数

- 2-flavor QCDのシミュレーションを行い、
- Reweightingで Nf-flavor の動的クォークの効果を取り入れる。
- Nf個のクォークは重いと仮定する。
- ホッピングパラメータ K 展開 (Wilson quarkの場合)

$$N_f \ln \left(\frac{\det M(K, \mu)}{\det M(0, 0)} \right) = N_f \left(288 N_{\text{site}} K^4 P + 12 \cdot 2^{N_t} N_s^3 K^{N_t} (\cosh(\mu/T) \Omega_R + i \sinh(\mu/T) \Omega_I) + \dots \right)$$

- 有効ポテンシャル

$$V(P) = -\ln [R(P, K) W(P, \beta)] =$$

$$\ln R(P) = \ln \left\langle e^{6N_{\text{site}}(\beta-\beta_0)\hat{P}} \prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)} \right\rangle_{P:\text{fixed}} \approx \ln \left\langle \exp(6hN_s^3 \hat{\Omega}_R) \right\rangle_{P:\text{fixed}} + (P\text{の}1\text{次項})$$

($\mu=0$ 質量縮退の場合)

有効ポテンシャルの曲率

$$V_{\text{eff}}(P, \beta, h, \mu) = V_{\text{eff}}(P, \beta_0, 0, 0) - \ln \bar{R}(P, h, \mu) + (P \text{ の } 1 \text{ 次項})$$

$$\bar{R}(P) = \left\langle \exp(6N_s^3 h \Omega_R) \right\rangle_{P:\text{fixed}} \quad (\mu=0 \text{ の場合})$$

Wilson quark の場合

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t}$$

staggered quark の場合

$$h = N_f / (4(2m_h)^{N_t})$$

- P の 1 次項は曲率に無関係
- P の 1 次項の中にしか β 依存性がない。
- 曲率は β によらない。

χ_P : plaquette susceptibility

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}(0)}{dP^2} \approx \frac{6N_{\text{site}}}{\chi_P}$$

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dP^2}(P, h, \mu) = \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dP^2}(P, 0, 0) - \frac{d^2 \ln \bar{R}}{dP^2}(P, h, \mu)$$

2-flavor

- 曲率が負になる領域を見つければ、

1 次相転移 (ダブル・ウェル・ポテンシャル)

$\mu \neq 0$ での有効ポテンシャル

$$V_{\text{eff}}(P, \beta, h) = V_{\text{eff}}(P, \beta, 0) - \ln R(P, h)$$

$N_f=2$ p4-スタaggerド・クォーク作用,
 $m_\pi/m_\rho \approx 0.7$ [PRD71,054508(2005)]

- $\ln R$ は h が大きくなるにつれて大きくなる。
- 曲率も h につれて大きくなる。
- $h \approx 0.06$ をこえると曲率が負の領域ができる。

$\ln R$ の曲率

$\ln \bar{R}$

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t} \quad (\text{Wilson quarks の場合})$$

臨界点: $h_c = 0.0614(69)$

臨界点の N_f 依存性

$$\underline{h_c = 0.0614(69)}$$

- N_f が大きくなるにしたがって、臨界質量が大きくなる。

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t} \quad \rightarrow \quad \kappa_h^c = \frac{1}{2} \left(\frac{h_c}{2N_f} \right)^{1/N_t}$$

- N_f が大きいと κ の臨界点が小さくなるので、
  - ホッピングパラメータ展開の近似がよくなる。
  - 反対に、 N_f が小さいと近似がよくない。
- $N_t=4$ クエンチ・シミュレーションの場合、 $\kappa=0.18$ ぐらいで、ホッピングパラメータ展開の1項目と2項目が同じぐらいの大きさ。
  - $N_f=10, N_t=4$ で、 $h_c = 0.0614(69) \rightarrow \kappa_h^c \approx 0.118$
    - これぐらいの N_f ならおそらく適用可能

有限密度での有効ポテンシャルの曲率

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dP^2}(P, h, \mu) = \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dP^2}(P, 0, 0) - \frac{d^2 \ln \bar{R}}{dP^2}(P, h, \mu)$$

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t} \quad \text{for Wilson quarks}$$

$$\ln R(P) = \ln \left\langle \underbrace{\left(\frac{\det M(m, \mu)}{\det M(m, 0)} \right)^2}_{\text{green}} \underbrace{\left(\frac{\det M(h, \mu_h)}{\det M(0, 0)} \right)^{N_f}}_{\text{red}} \right\rangle_{P:\text{fixed}} \quad \mu_h/T = 0$$

有限密度での臨界線

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t}$$

for Wilson quarks

$$h = N_f / (4(2m_h)^{N_t})$$

for staggered quarks

- クォーク行列式の計算:
 $O(\mu^6)$ のテイラー展開で見積もる
- 複素位相をガウス関数で近似

まとめと今後の展望

- テクニカラーモデルの構築を目指した軽いフェルミオンが2つある多フレーバーQCDの有限温度相転移が1次相転移かどうか調べた。
  - 電弱バリオジェネシスを実現するためには1次相転移が必要。
  - 強い1次相転移になるための条件(新粒子の予言など)が具体的に格子シミュレーションで計算できる。
- 重いクォークの質量が増加すると、1次相転移がクロスオーバーに変わる。
  - 1次相転移の終点の質量はフレーバー数が増えるにしたがって大きくなる。
- その臨界質量は化学ポテンシャルを大きくしても大きくなる。
  - 2+1フレーバーQCDでこのような性質が確認できたら、有限密度で臨界点があるとその強い証拠になる。
  - N_f が大きいときは一次相転移の領域が広いので、計算が容易になる。 N_f によらないユニバーサルな性質、3重臨界点付近のスケーリング則など、を調べるための良いモデルになる。